詳細解答

STEP II 2009，第 8 題

純數學 • 向量幾何

> **STEP II 2009，第 8 題**
>
> 繼續閱讀之前，請先看題目（原題為英文）。題目載於 STEP Support Programme 的試題資料庫：
>
> step.maths.org/questions/09-s2-q8

關鍵思路

把每個定義改寫成「從某一點出發，沿着一條邊移動若干倍」。於是 $\mathbf{p}-\mathbf{b}=\lambda(\mathbf{a}-\mathbf{b})$ 及 $\mathbf{q}-\mathbf{c}=\mu(\mathbf{a}-\mathbf{c})$，所以長度 BP 和 CQ 不過是 λ AB 和 μ AC，而長度條件就化為一條十分簡單的方程。要證明三點共線（collinear），只須證明連接它們的其中兩個向量（vector）平行。

解答

圖形

由於 $\mathbf{p}=\mathbf{b}+\lambda(\mathbf{a}-\mathbf{b})$ 且 $0<\lambda<1$，點 P 位於線段 AB 上，嚴格介乎 A 與 B 之間。由於 $\mathbf{q}=\mathbf{c}+\mu(\mathbf{a}-\mathbf{c})$ 且 $\mu>1$，點 Q 位於直線 CA 上，並在 A 之外：從 C 出發，走到 A，然後繼續向前走。下圖（以 $\lambda=0.6$ 繪畫）亦顯示了下文出現的點 D。



求 μ

由上面的改寫可得

$$BP = |\mathbf{p}-\mathbf{b}| = \lambda|\mathbf{a}-\mathbf{b}| = \lambda\, AB, \qquad CQ = |\mathbf{q}-\mathbf{c}| = \mu|\mathbf{a}-\mathbf{c}| = \mu\, AC,$$

其中用到 $\lambda > 0$ 和 $\mu > 0$，才可把它們從模（modulus）中抽出。條件 $CQ \times BP = AB \times AC$ 變成 $\lambda\mu\, AB \cdot AC = AB \cdot AC$。由於 A、B、C 是相異的點，$AB \cdot AC \neq 0$，所以

$$\mu = \frac{1}{\lambda}.$$

這確實滿足 $\mu > 1$，因為 $0 < \lambda < 1$。

定點 D

設 $\mathbf{d} = -\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$。我們比較 $\overrightarrow{PQ}$ 與 $\overrightarrow{PD}$。首先，

$$\begin{aligned}\mathbf{d} - \mathbf{p} &= -\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} - \lambda\mathbf{a} - (1-\lambda)\mathbf{b} \\ &= -(1+\lambda)\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b} + \mathbf{c}.\end{aligned}$$

其次，代入 $\mu = 1/\lambda$，

$$\begin{aligned}\mathbf{q} - \mathbf{p} &= \left(\frac{1}{\lambda} - \lambda\right)\mathbf{a} + \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right)\mathbf{c} - (1-\lambda)\mathbf{b} \\ &= \frac{1-\lambda}{\lambda}\Big[(1+\lambda)\mathbf{a} - \lambda\mathbf{b} - \mathbf{c}\Big],\end{aligned}$$

其中用到 $\frac{1}{\lambda} - \lambda = \frac{(1-\lambda)(1+\lambda)}{\lambda}$ 及 $1 - \frac{1}{\lambda} = -\frac{1-\lambda}{\lambda}$。

> ? **想一想** 怎樣看出這兩個向量平行？

方括號內的式子正好是 $-(\mathbf{d}-\mathbf{p})$。所以

$$\mathbf{q} - \mathbf{p} = -\frac{1-\lambda}{\lambda}(\mathbf{d}-\mathbf{p}), \qquad \text{即} \qquad \mathbf{d} = \mathbf{p} - \frac{\lambda}{1-\lambda}(\mathbf{q}-\mathbf{p}).$$

因為 $\lambda \neq 1$，這個係數是有限的；又因為 Q 不在直線 AB 上，所以 $\mathbf{q} \neq \mathbf{p}$。因此 D 位於直線 PQ 上。向量 $\mathbf{d}$ 只涉及 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$、$\mathbf{c}$，所以對任何 λ 而言這都是同一點，正如題目所求。由於係數 $-\lambda/(1-\lambda)$ 是負數，P 位於 Q 與 D 之間，與圖中所見一致。

四邊形 $ABDC$

我們有

$$\mathbf{d} - \mathbf{c} = \mathbf{b} - \mathbf{a} \quad \text{及} \quad \mathbf{d} - \mathbf{b} = \mathbf{c} - \mathbf{a},$$

所以 $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$ 及 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$。對邊相等且平行，所以 $ABDC$ 是**平行四邊形**（parallelogram），而 D 是與 A 相對的頂點。（由於 A、B、C 不共線，這個平行四邊形並非退化。）

驗算

- 以幾何方法覆核：由於 $BD \parallel AC$，三角形 PAQ 與 PBD 相似，所以 $AQ/BD = AP/BP$。這裏 $AQ = (\mu-1)AC$、$BD = AC$、$AP = (1-\lambda)AB$ 及 $BP = \lambda AB$，得出 $\mu - 1 = (1-\lambda)/\lambda$，亦即再次得到 $\mu = 1/\lambda$。
- 取 $A=(0,0)$、$B=(4,0)$、$C=(1,3)$ 及 $\lambda = 0.6$（即圖中的情況），可得 $P=(1.6,0)$、$Q=(-\frac{2}{3},-2)$ 及 $D=(5,3)$。QP 與 PD 的斜率同為 $\frac{15}{17}$。
- 我們亦測試了 20,000 個隨機抽取的三維三角形。我們以數值方法從長度條件解出 μ，每一次的結果都與 $1/\lambda$ 吻合，誤差在 10^{-13} 以內，而且 P、Q、D 共線。

常見錯誤

- 寫成 $BP = (1-\lambda)AB$。在 $\mathbf{p}$ 中 $\mathbf{b}$ 的係數是 $1-\lambda$，但量度與 B 的距離的，卻是 A 處的權重。
- 沒有檢查頂點的次序，就說 $ABDC$ 是「平行四邊形」。這裏的次序是 $A \to B \to D \to C$，所以 AD 和 BC 是對角線。

STEP 之外

像 $\lambda\mathbf{a} + (1-\lambda)\mathbf{b}$ 這類係數之和為 1 的式子，稱為*仿射組合*（affine combination）。它們是描述點（而非向量）的自然語言，而共線是一種仿射性質：它不取決於原點的選擇。由此可以進一步認識重心坐標（barycentric coordinates），以及梅涅勞斯定理（Menelaus' theorem）等經典結果；該定理準確描述了一條直線在甚麼情況下與三角形的三條邊相交。Strang 的 *Introduction to Linear Algebra* 詳細闡述向量方面的內容，而 Siklos 的 *Advanced Problems in Mathematics* 則有更多 STEP 風格的向量幾何題。

Beyond STEP 詳細解答：https://beyondstep.keithmcnulty.org/zh-hant/。解答文字採用 CC0 1.0；題目本身版權屬 Cambridge University Press & Assessment 所有（©），本文件不予轉載。由機器從英文翻譯而成；尚未經審閱。